

# ESCORE DE WELLS PARA TEP<sup>1</sup>

| Características clínicas                                                                          | Pontos            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Malignidade (sob tratamento, tratado nos últimos seis meses ou em terapia paliativa)              | 1                 |
| Hemoptise                                                                                         | 1                 |
| Imobilização por mais de três dias ou cirurgia nas quatro semanas anteriores                      | 1,5               |
| Sinais clínicos e sintomas de TVP (edema de membro inferior e dor à palpação das veias profundas) | 3                 |
| Frequência cardíaca >100 batimentos/min                                                           | 1,5               |
| TVP/TEP anteriores                                                                                | 1,5               |
| Diagnóstico alternativo menos provável que o de TEP                                               | 3                 |
| Escore simplificado de probabilidade clínica                                                      |                   |
| TEP provável                                                                                      | Mais de 4 pontos  |
| TEP improvável                                                                                    | 4 pontos ou menos |

1. National Institute for Health and Care Excellence. NICE clinical guideline 144. Venous thromboembolic diseases: the management of venous thromboembolic diseases and the role of thrombophilia testing. Disponível em: <http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/13767/59720/59720.pdf>. Acessado em: 31.01.2014.



ESCORE DE WELLS PARA TEP