

ESCORE DE WELLS PARA TVP¹

Características clínicas	Pontos
Câncer ativo (sob tratamento, nos últimos seis meses ou paliativo)	1
Paralisia, parestesia ou imobilização gessada recente de membros inferiores	1
Acamado por três dias ou mais ou cirurgia de grande porte com uso de anestesia geral ou regional nas últimas 12 semanas	1
Sensibilidade localizada ao longo da distribuição do sistema venoso profundo	1
Edema de todo membro inferior	1
Circunferência da panturrilha pelo menos 3 cm maior que o lado assintomático	1
Edema depressível restrito à perna sintomática	1
Veias colaterais superficiais (não varicosas)	1
TVP previamente comprovada	1
Diagnóstico alternativo pelo menos tão provável quanto o de TVP	-2
Escore simplificado de probabilidade clínica	
TVP provável	2 pontos ou mais
TVP improvável	1 ponto ou menos

1. National Institute for Health and Care Excellence. NICE clinical guideline 144. Venous thromboembolic diseases: the management of venous thromboembolic diseases and the role of thrombophilia testing. Disponível em: <http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/13767/59720/59720.pdf>. Acessado em: 31.01.2014.



ESCORE DE WELLS PARA TVP